


# Kaakabces

## Operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte

*Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie*



## **Inleiding**

Uw behandelend arts heeft bij u een ontsteking in de kaak/mondholte geconstateerd die operatief ontlast moet worden.

In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

## **De behandeling**

Op de operatiekamer wordt onder algehele narcose de ontsteking ontlast door middel van een klein sneetje. Na deze ingreep blijft vaak een drain achter in het wondgebied. De wond wordt via deze drain meerdere malen per dag gespoeld. Via het infuus krijgt u indien nodig antibiotica toegediend.

## **Na de behandeling**

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. U blijft opgenomen in het ziekenhuis zolang u nog antibiotica via het infuus krijgt en u nog een drain in het wondgebied heeft. Vaak is er ook sprake van zwelling, die grotendeels verdwenen moet zijn voor u naar huis kunt. De kaakchirurg bepaalt het moment van ontslag.

De pijnklachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol 500 mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

## **Mondverzorging**

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en 's avonds voordat u gaat slapen. Daarnaast wordt geadviseerd uw mond na het poetsen te spoelen met chloorhexidine 0,1%. Hiermee start u 24 uur na de operatie.

(Als bijwerking kan zijn een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling.) Bij ontslag krijgt u hiervoor een recept mee naar huis.

## **Wat u verder moet weten**

- Gebruik geen alcohol in combinatie met andere medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagt de genezing.
- Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
- Pas op met hete dranken (zoals thee) en warm voedsel tijdens de dag van de behandeling. Hierdoor kunnen nabloedingen optreden.
- Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer oppakken.
- Het hangt af van de pijn en het ongemak, wanneer u weer kunt gaan werken.

## **Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis**

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Kaakchirurgie als de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen, of als er sprake is van koorts (boven de 38,5° C).

Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag, telefoonnummer: 040-239 7030  
's Avonds en 's nachts afdeling Kortverblijf via telefoonnummer: 040-239 7800  
In het weekend de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer:  
040-239 8580 of via de centrale: 040-239 9111.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die gerust stellen aan uw behandelend arts en/of de verpleegkundige van de afdeling.

Meer informatie over kaakchirurgie in het Catharina-ziekenhuis kunt u ook nalezen op [www.kaakchirurgie-eindhoven.nl](http://www.kaakchirurgie-eindhoven.nl).

© Catharina-ziekenhuis  
Michelangelolaan 2  
Postbus 1350  
5602 ZA Eindhoven  
040 - 239 9111  
[www.catharina-ziekenhuis.nl](http://www.catharina-ziekenhuis.nl)

Patiëntenvoorlichting  
Mon/Kaakabces/09-08-2005